赛拉菌素滴剂说明书

宠物用外用药

【兽药名称】

通用名称：赛拉菌素滴剂

商品名称：赛乐滴

英文名称：Selamectin Spot-on Solution

汉语拼音：Sailajunisu Dipi

【主要成分】赛拉菌素

【性　　状】本品为无色至黄色液体。

【药理作用】

药效学　阿维菌素类[illegible]

药动学　在犬、猫给药皮肤给药后，一部分药物经皮肤吸收进入血液，一部分药物在动物体表被毛的经口进入消化道和血液。药物[illegible]力学研究表明，局部外用的赛拉菌素表现为持续吸收。赛拉菌素可在皮肤（尤其是皮脂腺）蓄积，保证在较长时间内皮毛上有足够的药物浓度来杀灭寄生虫，用药后30日收集的动物皮肤样品仍杀灭蚤卵及其幼虫。

【适　应　证】

犬：用于治疗和预防跳蚤（猫栉首蚤）感染；预防心丝虫病；治疗耳螨（[illegible]）、疥螨（[illegible]）、蠕形螨（[illegible]）、蠕虫（[illegible]）、成熟肠钩虫（管形钩虫）感染。

猫：用于治疗和预防跳蚤（猫栉首蚤）感染；预防心丝虫病；治疗耳螨（猫耳痒螨）、蠕虫（[illegible]）、成熟肠钩虫（管形钩虫）感染。

【用法与用量】以赛拉菌素计。外用：一次[illegible]，每1kg体重，犬、猫6mg，每月一次。

犬/猫跳蚤感染：在整个跳蚤发育周期内给药一次，第一次给药的时间在跳蚤活跃之前。

犬/猫心丝虫病：可以全年给药，或者至少在动物首次与蚊子接触后一个月内给药，随后每个月给药一次，直到最后一次到蚊虫季节结束。最后一次给药必须在最后与蚊子接触后一个月内给药。

犬/猫蛔虫感染、钩虫感染：仅用一次。

猫钩虫感染、耳螨：仅用一次。

犬疥螨感染：为完全清除疥螨，连用两次。

犬耳螨：使用一次后，兽医检查评估后决定是否使用第二次。

使用时，用力向下按压管盖，刺透药管的密封处，移走管盖，给动物用药。将动物颈脊后背肿胥部的毛发分开，暴露皮肤；使药管的尖端直接接触动物皮肤，按压药管将整管药液挤出，一处或几处，不要按摩用药部位，勿用于破损皮肤。按照表1和表2所[illegible]用。

表1　猫的赛拉菌素滴剂用法用量表

体重 (kg)	每管药量	药物浓度 (mg/ml)	使用量 (选用包装规格-ml)
≤2.5	15mg	60	0.25
2.6~7.5	45mg	60	0.75
>7.5	选择合适的2管或2管以上药液合用		

表2　犬的赛拉菌素滴剂用法用量表

体重 (kg)	每管药量	药物浓度 (mg/ml)	使用量 (选用包装规格-ml)
≤2.5	15mg	60	0.25
2.6~5.0	30mg	120	0.25
5.1~10.0	60mg	120	0.5
10.1~20.0	120mg	120	1.0
20.1~40.0	240mg	120	2.0
>40	选择合适的2管或2管以上药液合用		

【不良反应】

1.临床研究表明有1%左右的猫在用药部位或周围出现轻微性或非轻微性的暂时脱毛，极少数猫的给药部位会出现短暂的局部刺激症状，脱毛和局部刺激均可正常恢复，一般无需进行对症治疗。

2.少数犬/猫用药后，用药部位可能出现局部毛发团块和/或小量白色脱屑，这是[illegible]使用化妆品的正常现象，一般在给药后24小时消失，并不影响本品的安全性和疗效。

3.临床试验中，极少数（≤0.5%）犬/猫出现厌食、呕吐、流涎、腹泻、嗜睡、呼吸急促和肌肉震颤。[illegible]环内酯类药物一样，极少数犬猫会[illegible]

4.[illegible]犬使用3倍剂量的赛拉菌素[illegible]观察到过敏反应，建议再重复剂量的研究。

【注意事项】

1.本品仅用于犬猫，不得用于6周龄以下幼犬或8周龄以下的猫。

2.不得用于患病的犬猫、犬崽，或者冠及佳翁道环坐道鞋的犬猫。

3.犬/猫洗澡[illegible]周内勿给跳蚤感染。

[illegible]

继续恢复每月给药一次，这样将会可能降低犬心丝虫发育成熟[illegible]。预防犬心丝虫感染时，如果更换另一种[illegible]产品，必须在前一剂给药后一个月内给药。

[illegible]犬治疗耳螨时，应将外耳道内松散的碎屑去掉，治疗30日后经兽医检查，经兽医诊断后决定是否进行第二次治疗。

6.为了获得最佳的用药效果，请勿在宠物洗澡之前或洗澡之时或使用过洗发剂、沐浴露、用本品给宠物洗澡及使用香波不会降低本品的疗效。

7.治疗耳螨时，不能将药液直接滴于耳道。

8.用药后尽量避免大猫舔舐用药部位，如果发现大量部舔，部分猫会在短时内出现大量流涎现象。

9.[illegible]研究表明：犬只可安全用于经常使用如下兽用产品[illegible]：狗食品、猫食品、洗毛至洁系列、兽用洗发香波、类固醇、碘酒、洗发香波和药浴等。

10.不得用于婴人，勿让儿童触及。

11.本品可能对皮肤和眼睛有刺激性，用后洗手。如不慎皮肤接触药物，应立即用肥皂和清水冲洗，如发[illegible]用后肥皂等。

12.本品易燃，要远离热源、火源。

【休　药　期】无需制定。

【规　　格】(1) 0.25ml:15mg　(2) 0.75ml:[illegible]　(3) 0.25ml:[illegible]

(4) 0.5ml:60mg　(5) 1.0ml:120mg　(6) 2.0ml:240mg

【包　　装】(1) 1管/盒　(2) 3管/盒　(3) 6管/盒

【贮　　藏】遮光、密闭、在30℃以下保存。

【有效期】36个月。

【批准文号】(1) 0.25ml:15mg：兽药字110803395

(2) 0.75ml：45mg：兽药字110803396

(3) 0.25ml：30mg：兽药字110803397

(4) 0.5ml：60mg：兽药字110803398

(5) 1.0ml：120mg：兽药字110803399

(6) 2.0ml：240mg：兽药字110803400

【生产企业】

浙江海正动物保健品有限公司

地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路208号

电话：0571-23208916

传真：0571-23208915

网址：www.his[illegible]ah.com